

| Page | 項目 | 誤 | 正 | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--------|--|---|----------|--|--------|--|
| R-28 | 網膜電図 ■代表的なERGの波形 | a波: <u>双極細胞・Müller細胞</u> , b波: <u>視細胞(錐体・杆体)</u> | a波: <u>視細胞(錐体・杆体)</u> , b波: <u>双極細胞・Müller細胞</u> | | | | | | | | |
| R-104 | 原発性閉塞隅角緑内障 | ⑩~, コリン作 <u>用薬</u> (ピロカルピン)の~ | ⑩~, コリン作 <u>動薬</u> (ピロカルピン)の~ | | | | | | | | |
| S-68 | 側頭骨骨折 ■縦骨折 | 右の錐体 <u>頷</u> に沿って~ | 右の錐体 <u>稜</u> に沿って~ | | | | | | | | |
| U-36 | 統合失調症 | ⑤解体型(破瓜型), 緊張型, 妄想型および鑑別不能型に分けられる. | ⑤ <u>ICD-10では</u> , 解体型(破瓜型), 緊張型, 妄想型および鑑別不能型に分けられる. <u>DSM-5ではこれらの病型分類は廃止されている.</u> | | | | | | | | |
| U-36 | 統合失調症 | ■統合失調症の分類(<u>DSM-5</u>) | ■統合失調症の分類(<u>ICD-10</u>) | | | | | | | | |
| U-49 | Korsakoff症候群 (項目名ルビ) | <u>コルサコフ</u> | <u>コルサコフ</u> | | | | | | | | |
| U-54 | 摂食障害 ■診断基準の要約(DSM-5) | <p>【誤】</p> <p>■ 診断基準の要約(DSM-5) 青枠-誤</p> <table border="1"> <tr> <td>神経性食思不振症</td> <td>肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u>, 体重と体型に対する過大評価 標準体重の <u>85%</u>以下のやせ <u>無月経</u></td> </tr> <tr> <td>神経性大食症</td> <td>肥満恐怖, <u>体重と体型に対する過大評価</u> <u>むちゃ食い</u>エピソードの繰り返し(週 <u>2</u>回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u>, 下剤, 利尿薬, 絶食など)</td> </tr> </table> <p>※AN でも, むちゃ食い/排出行動が認められる病型があるが, 体重減少と<u>無月経</u>の有無で BN と区別される.</p> | 神経性食思不振症 | 肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u> , 体重と体型に対する過大評価 標準体重の <u>85%</u> 以下のやせ <u>無月経</u> | 神経性大食症 | 肥満恐怖, <u>体重と体型に対する過大評価</u> <u>むちゃ食い</u> エピソードの繰り返し(週 <u>2</u> 回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u> , 下剤, 利尿薬, 絶食など) | <p>【正】</p> <p>■ 診断基準の要約(DSM-5) 青枠-正</p> <table border="1"> <tr> <td>神経性食思不振症</td> <td>肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u>, <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u>, 現在の低体重に対する深刻さの欠如 カロリー摂取制限による著しい低体重</td> </tr> <tr> <td>神経性大食症</td> <td>肥満恐怖, <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u> <u>むちゃ食い</u>エピソードの繰り返し(週 <u>1</u>回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u>, 下剤, 利尿薬, 絶食など)</td> </tr> </table> <p>※AN でも, むちゃ食い/排出行動が認められる病型があるが, 体重減少の有無で BN と区別される.</p> | 神経性食思不振症 | 肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u> , <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u> , 現在の低体重に対する深刻さの欠如 カロリー摂取制限による著しい低体重 | 神経性大食症 | 肥満恐怖, <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u> <u>むちゃ食い</u> エピソードの繰り返し(週 <u>1</u> 回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u> , 下剤, 利尿薬, 絶食など) |
| 神経性食思不振症 | 肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u> , 体重と体型に対する過大評価 標準体重の <u>85%</u> 以下のやせ <u>無月経</u> | | | | | | | | | | |
| 神経性大食症 | 肥満恐怖, <u>体重と体型に対する過大評価</u> <u>むちゃ食い</u> エピソードの繰り返し(週 <u>2</u> 回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u> , 下剤, 利尿薬, 絶食など) | | | | | | | | | | |
| 神経性食思不振症 | 肥満恐怖, <u>ボディイメージの障害</u> , <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u> , 現在の低体重に対する深刻さの欠如 カロリー摂取制限による著しい低体重 | | | | | | | | | | |
| 神経性大食症 | 肥満恐怖, <u>自己評価に対する体重や体型の過大な影響</u> <u>むちゃ食い</u> エピソードの繰り返し(週 <u>1</u> 回/3ヵ月以上) 不適切な代償行為(<u>自己誘発性嘔吐</u> , 下剤, 利尿薬, 絶食など) | | | | | | | | | | |
| U-55 | 摂食障害 ■摂食障害の身体症状 | <u>無月経</u> | <u>月経不順</u> | | | | | | | | |
| U-56 | 睡眠障害 ■睡眠段階(Rechtschaffen & Kalesの分類による) (表)「REM睡眠期」の行 | <u>α+β波(低振幅)</u> , ~ | <u>θ波(低振幅)</u> , <u>β波</u> , ~ | | | | | | | | |
| W-53 | 尿路結石 ■結石の成分とその特徴 | 痛風, 尿酸排泄促進剤, ループ利尿薬, <u>サイアザイド系利尿薬</u> | 痛風, 尿酸排泄促進剤, ループ利尿薬(<u>削除</u>) | | | | | | | | |